

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Urologen

2. Quartal 2010

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 104.913
 Diagnoseeinträge: 454.461
 Anzahl Praxen: 71

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 1 | N40 | Prostatahyperplasie | 43,33 |
| 2 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 18,55 |
| 3 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 18,21 |
| 4 | Z12 | Spezielles Screening auf Neubildungen | 15,65 |
| 5 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 14,62 |
| 6 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 12,01 |
| 7 | R39 | Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen | 11,73 |
| 8 | Q61 | Zystische Nierenkrankheit | 8,70 |
| 9 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 7,30 |
| 10 | R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 7,23 |
| 11 | E11 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 6,36 |
| 12 | N31 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | 6,31 |
| 13 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 6,30 |
| 14 | N30 | Zystitis | 5,81 |
| 15 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 5,03 |
| 16 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 4,95 |
| 17 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 4,63 |
| 18 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 4,41 |
| 19 | C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 4,36 |
| 20 | R35 | Polyurie | 4,19 |
| 21 | E66 | Adipositas | 4,09 |
| 22 | D29 | Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane | 4,08 |
| 23 | F45 | Somatoforme Störungen | 3,96 |
| 24 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 3,91 |
| 25 | N18 | Chronische Niereninsuffizienz | 3,88 |
| 26 | N41 | Entzündliche Krankheiten der Prostata | 3,84 |
| 27 | N32 | Sonstige Krankheiten der Harnblase | 3,37 |
| 28 | N48 | Sonstige Krankheiten des Penis | 3,18 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Urologen im 2. Quartal 2010

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 29 | N43 | Hydrozele und Spermatozele | 3,09 |
| 30 | M54 | Rückenschmerzen | 3,03 |
| 31 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 3,01 |
| 32 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 2,99 |
| 33 | N11 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis | 2,97 |
| 34 | R30 | Schmerzen beim Wasserlassen | 2,94 |
| 35 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,87 |
| 36 | N42 | Sonstige Krankheiten der Prostata | 2,68 |
| 37 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,67 |
| 38 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 2,61 |
| 39 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 2,58 |
| 40 | K40 | Hernia inguinalis | 2,39 |
| 41 | N35 | Harnröhrenstriktur | 2,34 |
| 42 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 1,92 |
| 43 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 1,91 |
| 44 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 1,74 |
| 45 | F32 | Depressive Episode | 1,74 |
| 46 | E10 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | 1,71 |
| 47 | R82 | Sonstige abnorme Urinbefunde | 1,69 |
| 48 | I84 | Hämorrhoiden | 1,57 |
| 49 | N50 | Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane | 1,50 |
| 50 | N45 | Orchitis und Epididymitis | 1,50 |
| 51 | E29 | Testikuläre Dysfunktion | 1,48 |
| 52 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,39 |
| 53 | R33 | Harnverhaltung | 1,33 |
| 54 | D40 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der männlichen Genitalorgane | 1,33 |
| 55 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 1,29 |
| 56 | I50 | Herzinsuffizienz | 1,28 |
| 57 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 1,19 |
| 58 | M10 | Gicht | 1,04 |
| 59 | K80 | Cholelithiasis | 1,03 |
| 60 | N26 | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet | 1,03 |
| 61 | N81 | Genitalprolaps bei der Frau | 1,02 |
| 62 | Q63 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere | 0,97 |
| 63 | D41 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Harnorgane | 0,97 |
| 64 | H40 | Glaukom | 0,91 |
| 65 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,89 |
| 66 | C68 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | 0,86 |
| 67 | M13 | Sonstige Arthritis | 0,84 |
| 68 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,84 |
| 69 | N08 | Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifiz. Krankh. [A40-A41+,A52.7+,B26.8+,B52.0+,B65.-+,B78.-+,C88.0-+,C90.0-+, D57.-+, D59.3+, D65+,D69.0+,D89.1+,E10-E14+,4.Stelle .2, E75.2+, E78.6+, E85.-+, I33.0+,M30.0+,M31.0+/.1+/.3+,M32.1+] | 0,83 |
| 70 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,83 |
| 71 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,80 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Urologen im 2. Quartal 2010

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 72 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 0,79 |
| 73 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 0,78 |
| 74 | C62 | Bösartige Neubildung des Hodens | 0,76 |
| 75 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,75 |
| 76 | Q60 | Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere | 0,74 |
| 77 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 0,73 |
| 78 | K37 | Nicht näher bezeichnete Appendizitis | 0,73 |
| 79 | I70 | Atherosklerose | 0,71 |
| 80 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 0,70 |
| 81 | Z93 | Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung | 0,68 |
| 82 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,67 |
| 83 | N23 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik | 0,66 |
| 84 | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen Lokalisationen | 0,66 |
| 85 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,64 |
| 86 | R80 | Isolierte Proteinurie | 0,62 |
| 87 | N21 | Stein in den unteren Harnwegen | 0,59 |
| 88 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,59 |
| 89 | J45 | Asthma bronchiale | 0,58 |
| 90 | I86 | Varizen sonstiger Lokalisationen | 0,57 |
| 91 | N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,56 |
| 92 | Q55 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane | 0,55 |
| 93 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,54 |
| 94 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 0,52 |
| 95 | N33 | Krankheiten der Harnblase bei anderenorts klassifizierten Krankheiten [A18.1+, B65.-+] | 0,51 |
| 96 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,51 |
| 97 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,51 |
| 98 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,50 |
| 99 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 0,49 |
| 100 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,48 |