



KLEIN UND GEMEIN GIB VIREN UND BAKTERIEN KEINE CHANCE!

INFORMATION FÜR UNSERE PATIENTEN

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

- Viele Impfungen müssen regelmäßig aufgefrischt werden, damit der Impfschutz erhalten bleibt. Deshalb ist Impfen auch für Erwachsene ein Thema.
- Impfungen schützen nicht nur den Geimpften. Sind genügend Menschen immunisiert, können einzelne Krankheitserreger wie das Masernvirus ausgerottet werden.
- Moderne Impfstoffe gehören zu den sichersten Arzneimitteln überhaupt. Schwere Nebenwirkungen oder dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigungen sind extrem selten. Gelegentlich können nach einer Impfung Rötungen oder Schwellungen an der Einstichstelle oder Fieber auftreten. Sie sind ein positives Zeichen dafür, dass der Körper Abwehrkräfte mobilisiert.
- Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für alle Impfungen, die in der Schutzimpfungsrichtlinie als Kassenleistung aufgeführt werden. Grundlage dafür bilden die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts.

NICHT VERGESSEN: IMPFSCHUTZ AUFBAUEN – UND AUFFRISCHEN LASSEN

Impfen ist eine der einfachsten und wirksamsten vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz vor schweren Infektionskrankheiten. Sprechen Sie Ihren Arzt auf Ihren Impfschutz an. Er wird Sie beraten, welche Impfungen ergänzt oder aufgefrischt werden müssen.

DIE KASSENÄRZTLICHEN VEREINIGUNGEN UND DIE KASSENÄRZTLICHE BUNDES- VEREINIGUNG

Ihre Gesundheit ist unsere Verantwortung. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt mit ihren rund 3.900 niedergelassenen Haus- und Fachärzten sowie Psychotherapeuten stellt sicher, dass Sie ärztlich auf qualitativ hohem Niveau versorgt werden und sorgt dafür, dass Sie den Arzt und Psychotherapeuten Ihrer Wahl aufsuchen können. Egal, in welcher Krankenkasse Sie versichert sind.

Haben Sie Fragen zu Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen? Die KV Sachsen-Anhalt steht Ihnen unter der Tel.-Nr.: **0391 627-7438** zur Verfügung.

Mehr Informationen im Internet unter www.kvsa.de

..... Mit freundlichen Grüßen von Ihrem Praxisteam

WARUM IMPFEN?

Diese Krankheiten können durch eine Impfung verhindert werden
(entsprechend den Standard-Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommmission [STIKO] des Robert Koch-Instituts)

	empfohlenes Impftermin										Mein nächster Impftermin
	6 Wochen	2 Monate	3 Monate	4 Monate	11-14 Monate	15-23 Monate	5-6 Jahre	9-14 Jahre	15-16 Jahre	ab 18 Jahre	
Diphtherie		1.	2.	3.	4.		A	A		A**	
Wundstarrkrampf (Tetanus)		1.	2.	3.	4.		A	A		A**	
Keuchhusten (Pertussis)		1.	2.	3.	4.		A	A		A***	
Haemophilus influenzae Typ b (Hib)		1.	2.*	3.	4.						
Kindertähmung (Poliomylitis)			1.	2.*	3.	4.		A			
Hepatitis B		1.	2.*	3.	4.						
Masern		1.	2.*	3.	4.						
Mumps („Ziegenpeter“)					1.	2.				S#	
Röteln											
Windpocken				1.	2.						
Influenza (Grippe)										S**	
Pneumokokken +		1.	2.	3.						S***	
Meningokokken					1.						
Humane Papilloma-viren (HPV)***							S				
Rotaviren		1.	2.	3.*							
Herpes zoster („Gürtelrose“)										S##	

Diphtherie ist eine lebensbedrohliche, hochansteckende Erkrankung der oberen Atemwege. Zusätzlich können durch das Bakterium Herz, Nerven und Nieren geschädigt werden. In Deutschland tritt die Krankheit nur noch selten auf. Um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, ist eine hohe Impf-beteiligung erforderlich.

Tetanus wird durch Bakterien hervorgerufen, die vor allem in der Erde oder im Straßensaub vor-kommen. Bereits bei kleinsten Verletzungen, z.B. bei der Gartenarbeit, kann der Erreger in den Körper gelangen. Das Nervengift führt zu einer krankhaften Starre der Muskulatur. Ist die Atemmuskulatur betroffen, droht der Erstickenstod.

Keuchhusten ist hochansteckend und tritt immer häufiger nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen auf. Es kommt zu schweren Hustenattacken mit Atemnot, Erbrechen und Ersticken-gefällen.

Das Bakterium Haemophilus influenzae Typ b kann vor allem bei Säuglingen und Kindern unter fünf Jahren schwere Erkrankungen wie Lungenentzündung, Kehlkopfentzündung oder die besonders ge-fährliche eitrige Hirnhautentzündung auslösen.

Die Kindertähmung ist eine fieberhafte Viruserkrankung. Sie kann zu bleibenden Lähmungen, im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. Ungeschützt der Bezeichnung können auch Erwachsene an Kindertähmung erkranken.

Hepatitis B ist eine Entzündung der Leber, die in vielen Fällen nicht vollständig ausheilt. Dann bleiben Viren im Körper und können die Leber fortlaufend schädigen. Die Infektion mit dem Virus erfolgt über Blut und andere Körperflüssigkeiten.

Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Neben Komplikationen wie Lungen- oder Mittelohr-entzündung kommt es bei etwa jeder 1.000 Erkrankung zu einer Entzündung des Gehirns. Sie kann tödlich enden oder zu bleibenden körperlichen Schäden führen.

Mumps betrifft vorwiegend die Speicheldrüsen, vor allem die Ohrspeicheldrüsen, die stark anschwel-len. Auch hier besteht die Gefahr schwerer Komplikationen wie einer Infektion der Hirnhaut. Auch die Hoden bzw. Eierstöcke können betroffen sein. Bei einer Erkrankung in den ersten drei Schwanger-schaftsmonaten kann es zu einer Fehlgeburt kommen.

Inhazieren sich Schwangere mit dem Röteln-Virus, kann dies zu einer Fehlgeburt oder zu Fehlbildungen der Organe des ungeborenen Kindes führen. Mit der generellen Impfung für Jungen und Mädchen soll die Krankheit zurückgedrängt und damit auch verhindert werden, dass Schwangere sich überhaupt anstecken können.

Windpocken zeigen bei Erwachsenen, Säuglingen und bei abwehrgeschwächten Menschen oft einen schweren Krankheitsverlauf als bei Kindern und können zu Komplikationen wie Lungen- oder Hirn-hautentzündung führen. Werden Windpocken während einer Schwangerschaft auf das Ungeborene übertragen, können Fehlbildungen auftreten.

Typische Symptome der Virus-Grippe – die nicht mit einer Erkältung oder einem grippalen Infekt zu verwechseln ist – sind hohes Fieber, ein trockener Husten und starke Kopf- und Gliederschmerzen. Be-sonders für Ältere und chronisch Kranke ist die Erkrankung gefährlich. Jährlich sterben in Deutschland mehrere tausend Menschen an den Folgen der Influenza.

Pneumokokken sind Bakterien, die sich schnell im Organismus ausbreiten und schwere Infektionen wie Hirnhaut-, Lungen- und Mittelohrentzündung sowie Blutvergiftung verursachen können. Beson-ders gefährdet sind ältere Menschen und Kinder mit Vorerkrankungen oder Abweh-schwäche sowie Säuglinge.

Meningokokken sind durch Tröpfcheninfektion, also z.B. Niesen oder Husten, übertragene Bakterien, die schwere Erkrankungen wie Hirnhautentzündung (Meningitis) oder Blutvergiftung hervorrufen kön-nen. Besonders häufig erkranken Säuglinge und Kleinkinder sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

Humane Papillomaviren können Gebärmutterhalskrebs, Penis- und Analkrebs sowie Krebskan-kenen der Mundhöhle und des Rachens auslösen. Sie werden durch Geschlechtsverkehr übertragen, daher sollte die Impfung der Mädchen und Jungen möglichst vor dem ersten Sexualkontakt erfolgen.

Rotaviren sind die häufigsten Auslöser von Durchfall bei Säuglingen und Kleinkindern. Die zum Teil erheblichen Flüssigkeitsverluste können bei jüngeren Kindern lebensbedrohlich sein, sie müssen dann im Krankenhaus behandelt werden. Die Viren sind hoch infektiös und weitgehend resistent gegen Des-infektionsmittel und Handseifen. Daher wird eine Impfung empfohlen, um der Infektion vorzubeugen.

In Deutschland erkranken jährlich mehr als 300.000 Menschen an einer Herpes-zoster-Virusinfektion. Als Komplikation der Erkrankung können Nervenschmerzen auftreten, die Wochen bis Monate nach Abheilen des Hautausschlags bestehen bleiben können.

Hinweise: Die oben genannten Impfungen entsprechen den Standard-impf-empfehlungen der Ständigen Impfkommmission (STIKO) des Robert Koch-Instituts. Es gibt weitere Impfempfehlungen für Frauen im gebärfähigen Alter, bestimmte Risiko- und Berufsgruppen, für Reisen etc., die aus Platzgründen nicht aufgeführt sind. Sprechen Sie Ihren Arzt ggf. darauf an.

Generell empfiehlt die STIKO, A Auffrischung # Masern-Impfung für alle nach 1970 geborenen Erwachsenen, die noch gar nicht oder nur einmal in der Kindheit geimpft wurden oder deren Impfschutz unklar ist

S Standardimpfung S Auffrischung # zweiteilige Impfung im Abstand von mind. 2 bis max. 6 Monaten

* bei bestimmten Impfstoffen kann dieser Impfermin entfallen ** jährlich mit aktuellem Impfstoff Wiederimpfung alle 5 Jahre *** (nur bei bestimmten Indikationen)

** Wiederimpfung alle 10 Jahre *** Grundimmunisierung mit 2 bzw. 3 Dosen je nach Alter und Impfstoff *** einmalig im Erwachsenenalter

+ Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impstoffdosis im Alter von 3 Monaten.

Stand: Mai 2019